

名称	コミナティ	スパイクバックス	ダイチロナ	コスタイベ	ヌバキソビッド
(製薬会社)	(ファイザー社)	(モデルナ・ジャパン社)	(第一三共社)	(Meiji Seikaファルマ社)	(武田薬品工業社)
発現割合	症状				
50パーセント以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛	接種部位の痛み、疲労、頭痛	接種部位の痛み、倦怠感	接種部位の痛み	接種部位の痛み、疲労、筋肉痛、頭痛
10から50パーセント	筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、接種部位の腫れ	筋肉痛、悪寒、関節痛、吐き気・嘔吐、リンパ節の腫れや痛み、発熱、接種部位の腫れ・しこり・赤み	接種部位の熱感・腫れ・赤み・かゆみ・しこり、頭痛、発熱、筋肉痛	倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、接種部位の腫れ・しこり・赤み	倦怠感、関節痛、吐き気・嘔吐
1から10パーセント	接種部位の赤み、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛	痛み・腫れ・赤み等（注記）	赤み・腫れ・かゆみ・熱感・しこり・痛み（注記）、リンパ節の腫れや痛み、発疹、腋の痛み	接種部位のかゆみ、下痢、悪心、吐き気、嘔吐	接種部位の腫れ・しこり・赤み、発熱、四肢痛

各社の添付文書より厚労省が作成したリーフレット参照 （注記）接種後7日以降のワクチンを接種した接種部位の症状