

小金井市予防接種実施一覧表

種 目			接種対象年齢	標準的な接種年齢	接種方法・回数	実施期間 集団・個別
B C G			生後 1 歳に至るまで	生後 5 月に達した時から 生後 8 月に達するまで	管針法による経皮 1 回	通年・ 個別接種
四種混合 (DPT-IPV) (ジフテリア・ 百日せき ・破傷風 ・ポリオ)	I 期	接 初 種 回	生後 2 月から 生後 9 0 月 (7 歳 6 か月) に至るまで	生後 2 月に達した時から 生後 1 2 月に達するまで	2 0 日以上間隔をおいて 皮下 3 回	通年・ 個別接種
		接 追 種 加		初回接種終了後 1 2 月に達した時から 1 8 月に達するまで	初回接種終了後 6 月以上の間隔を おいて皮下 1 回	通年・ 個別接種
五種混合① (DPT-IPV-Hib) (ジフテリア・ 百日せき ・破傷風 ・ポリオ ・ヒブ)	I 期	接 初 種 回	生後 2 月から 生後 9 0 月 (7 歳 6 か月) に至るまで	生後 2 月から生後 7 月に至るまで に開始し、2 0 日から 5 6 日まで の間隔をおいて 3 回	2 0 日以上間隔で皮下又は 筋肉内 3 回	通年・ 個別接種
		接 追 種 加		初回接種終了後、6 月から 1 8 月 までの間隔をおいて 1 回	初回接種終了後 6 月以上の間隔を おいて皮下又は 筋肉内 1 回	通年・ 個別接種
二種混合② (DT) (ジフテリア・ 破傷風)	II 期		1 1 歳以上 1 3 歳未満	1 1 歳に達した時から 1 2 歳に達するまで	皮下 1 回	通年・ 個別接種
麻しん・風しん 混合 (MR) ③	I 期		生後 1 2 月から生後 2 4 月に至るまで	左記に同じ	皮下 1 回	通年・ 個別接種
	II 期		5 歳以上 7 歳未満 で、小学校に就学す る日の 1 年前から就 学日の前日まで	左記に同じ	皮下 1 回	通年・ 個別接種
日本脳炎 ④	I 期	接 初 種 回	生後 6 月から 生後 9 0 月 (7 歳 6 か月) に至るまで	3 歳に達した時から 4 歳に達するまで	6 日以上間隔をおいて皮 下 2 回	通年・ 個別接種
		接 追 種 加		4 歳に達した時から 5 歳に達するまで	初回接種終了後 6 月以上の間隔をおいて 皮下 1 回	通年・ 個別接種
	II 期		9 歳以上 1 3 歳未満	9 歳に達したときから 1 0 歳に達するまで	9 歳以上で皮下 1 回	
ヒブワクチン ⑤	初回 免疫		生後 2 月から 生後 6 0 月 (5 歳) に至る まで	生後 2 月から生後 7 月に 至るまで	2 7 日以上間隔をおいて 皮下 3 回	通年・ 個別接種
	追加 免疫			初回免疫終了後 7 月から 1 3 月まで	初回免疫終了後 7 月以上間隔をおいて皮 下 1 回	
小 児 用 肺 炎 球 菌 ワ ク チ ン ⑤	初回 免疫		生後 2 月から 生後 6 0 月 (5 歳) に至る まで	生後 2 月から生後 7 月に 至るまで	2 7 日以上の間隔で皮下 又は筋肉内 3 回	通年・ 個別接種
	追加 免疫			生後 1 2 月から 生後 1 5 月に至るまで	初回免疫終了後 6 0 日 以上間隔をおいた後で、生 後 1 2 月に至った日以降 に皮下又は筋肉内 1 回	
水 痘	初回接種		生後 1 2 月から生後 3 6 月 (3 歳) に至る まで	生後 1 2 月から 生後 1 5 月に至るまで	皮下 1 回	通年・ 個別接種
	追加接種			初回接種終了後 6 月から 1 2 月の間隔をおいたあと	3 月以上の間隔をおいて 皮下 1 回	
B型肝炎ワクチン			生後 1 歳に至るまで	生後 2 月から生後 9 月に 至るまで	2 7 日以上間隔をおいて 皮下に 2 回接種後、第 1 回目の接種から 1 3 9 日 以上の間隔をおいて皮下 に 1 回	通年・ 個別接種

ロタウイルス ワクチン	ロタリックス	出生6週0日後から 24週0日後まで	生後2月から出生24週0日後ま で ※初回は14週6日まで	27日以上間隔を置いて 2回経口接種	通年・ 個別接種
	ロタテック	出生6週0日後から 32週0日後まで	生後2月から出生32週0日後ま で ※初回は14週6日まで	27日以上間隔を置いて 3回経口接種	
子宮頸がんワ クチン ⑤	2 価 (サーバリックス)	小学校6年生から 高校1年生相当の 女子	中学校1年生の間。2回目接種は 1回目接種1か月後、3回目接種 は1回目接種後6か月後	筋肉内3回接種 2回目は1回目接種から1 月～2月半後。3回目は1 回目接種から5月～12か 月後	通年・ 個別接種
	4 価 (ガーダシル)		中学校1年生の間。2回目接種は 1回目接種2か月後、3回目接種 は1回目接種後6か月後	筋肉内3回接種 2回目は1回目接種から少 なくとも1月以上間隔を あける。3回目は2回目 接種から少なくとも3月 以上間隔をあける。	
	9 価 (シルガード)		中学校1年生の間。2回目接種は 1回目接種1か月後、6か月の計2 回接種	筋肉内接種3回 2回目は1回目接種から 少なくとも1月以上間隔 をあける。3回目は2回 目接種から少なくとも3 月以上間隔をあける。 ※15歳未満は通常6月 (少なくとも5月)以上 あけて2回接種。5か月 未満で2回目接種をした 場合は3回接種。	

- ① 令和6年度より四種混合ワクチン及びヒブワクチンに代わり、五種混合ワクチン接種が開始となりました。新たに接種を開始された方は五種混合で接種を行うこととします。
- ② 二種混合（ジフテリア・破傷風）の予診票は、小学校6年生の4月下旬に送付いたします。
- ③ 麻しん・風しん混合（MR）Ⅱ期の予診票は、小学校入学1年前の4月下旬に送付いたします。
- ④ 日本脳炎Ⅱ期の予診票は、小学校4年生の4月下旬に送付いたします。
- ⑤ ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチン（9価）は、接種開始の月齢で接種回数が異なります。

※②と④に関してそれ以前に接種をご希望の際は、小金井市福祉保健部健康課までお申し込みください。